Page 1
Page 2
Page 3



Abb. 5 u. 6 *Ansicht der Orthese mit Knöchelfassung und Klettverschluss.*

bis Wochen vollständig ab. Geringfügige Anpassungen der Orthese sind meistens notwendig (Druckstellen am Kahnbeinhöcker und Köpfchen des Mittelfußknochens V). Das erreichte Resultat blieb bei den bisher versorgten Patienten stabil bezüglich Schmerzlinderung und Stellungskorrektur (Nachbeobachtungszeit ein bis drei Jahre). Sekundärbeschwerden traten nicht auf. Von 16 Patienten tragen 15 die Schiene täglich. Eine einzige Patientin hat die Orthese wieder weggelassen wegen Blasenbildung medial nach sofortiger übergebührlicher Nutzung.

Die Autoren:
A. Bosshard
Ortho-Team AG
Effingerstrasse 37
CH - 3008 Bern

Dr. med. M. Weber
Leiter Fußchirurgie
Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie
Inselspital
CH - 3010 Bern

Abb. 7 u. 8 *Orthese im angelegten Zustand und im Halbschuh.*

Abb. 9 u. 10 *Ausführung ohne Klettverschluss für die Verwendung im Schaftschuh.*